

Maïs 2016

Teelttips:

Bemesting

Zorg voor de juiste PH van de grond, i.v.m. de opneembaarheid van meststoffen en sporenelementen.

2 ltr. Borium toevoegen aan de tankmix geeft een hogere korrelopbrengst.

Door physiostart toe te passen bij de inzaai, wordt de jeugdgroei bevorderd en wordt stress voorkomen.

Vraag aan uw vertegenwoordiger welke het beste past:

-Physiostart P, 20 kg 8-28-0+23 SO₃+2 Zn

-Physiostart NK, 25-30 kg 17-0-5+48 SO₃+2 Zn

Onttrekking meststoffen in kg's per ha op basis van 19 ton drogestof opbrengst:

N	230	Mg	40
P	85	S	20
K	295		

Voorkeursrassen 2016

FAO	Kwaliteit in zetmeel		FAO	Opbrengst		FAO	Korrel/CCM
200	Asgaard		200	DKC 3333		210	Sunshinos
220	Feeditop		230	LG 30.224		225	ES Crossman
235	Genialis		240	P 9027			
215	LG 30.215		240	SY Fanatic			
240	Millesim		245	Borelli			
210	P 8057						
215	LG 31.218						

Retengo Plust

Een bespuiting met Retengo Plus geeft bescherming tegen bladschimmels.

Uit praktijkproeven kwam de volgende opbrengstverhoging naar voren:

Opbrengstverhoging bij dosering van 1,5l/ha		100=
DS opbrengst	+1,1%	17.750 kg
VEM/kg ds	+4,1%	996
Zetmeelopbrengst	+6,2%	



Aanbevelende rassenlijst snijmaïs zeer vroege en vroege rassen

Overzicht van raseigenschappen-Gemiddelde resultaten over de jaren 2010 t/m 2015

Rassenlijst	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Bullenbrandresistentie	Helminthosporium tolerantie	Plantlengte	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%drogestof	VEM/kgds	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst
Asgaard	8	8,5	*	7	*	*	99,9	8,5	111	108	107	100	98	98
DKC 3333	8	8	*	7	*	*	98	7,5	105	100	96	101	99	100
P 8057	8,5	8	8,5	8	8,5	8,5	102	8	103	102	101	101	98	99
LG 30.211	8	8,5	8,5	8	8	7,5	100	8	103	102	100	100	100	99
LG 31.218	7	7,5	*	8	*	*	105	8	102	102	102	101	100	101
LG 30.215	7,5	7,5	*	8	*	*	108	7,5	100	104	105	99	101	100
LG 30.218	8,5	8,5	9	7	8,5	7,5	98,2	7,5	98	100	101	100	100	101
LG 30.224	7,5	7,5	8,5	8	9	*	102	7	95	92	95	100	103	104
100 =							271		35,56	388	385	1013	20,6	20,87

Aanbevelende rassenlijst snijmaïs middenvroeg en middenlate rassen

Rassenlijst	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Bullenbrandresistentie	Helminthosporium tolerantie	Plantlengte	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%drogestof	VEM/kgds	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst
Torres	7,5	7	7	8	8,5	8	102	8	102	105	103	101	98	98
Sunstar	8	8	8	8,5	7,5	8	100	7	98	95	97	100	101	101
SY Fanatic	7,5	7	*	8	8,5	8	105	6,5	94	95	102	102	100	103
100 =							291		34,61	375,3	378	1001	21,89	21,93

Meerjarige resultaten Korrelmaïs/CCM 2010 t/m 2015: RL2016

Rassenlijst	Snelheid grondbedekking	Vroegheid bloei	Plantlengte	Helminthosporium tolerantie	Oogstbaarheid	Stengelrot resistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Korrel		
									Vochtgehalte	Drogestof gehalte	Drogestof opbrengst
Sunshinos	7,5	8	93	7,5	7,5	7	8,5	9	28,4	100	99
GenialisKWS	8	7	98	7,5	8	7,5	7,5	7,5	29,5	99	103
ES Crossman	7	7	110	7	7,5	7,5	6,5	7	30,0	98	105
Millesim	8	8	99	7	8,5	8	8	8,5	30,9	97	104
3 jaar onderzoek											
LG 30.215	8,5	7,5	103	7	6	6	7,5	7,5	29,8	98	101
100 =			290						71,5		11,1

Sonido

De ontsmetting met Sonido zorgt voor een bescherming tegen ritnaalden en fritvliegen en werkt ook tegen bladluizen.

Onderstaande rassen zijn leverbaar met Sonido ontsmetting, mits tijdig besteld.

Sonido:
Asgaard
Borelli
DKC 3333
Genialis
LG 31.218
Millesim
P 8057
P 9027

ritmaalen		fritvlieg
zware druk	gem. druk	
+++	+++(+)	+++

